

Skinsept® Mucosa

Roztok k dezinfekci okolní pokožky pohlavních orgánů, k její dezinfekci před operačními výkony a zaváděním cévek, dále k udržování hygieny dutiny ústní.

Účinný proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím (především proti stafylokokům, streptokokům, korynebakteriím, enterokokům, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*), kvasinkám (*Candida albicans*), některým virům (virus působící opar, HIV) a prvokům.

Obsah účinných látek ve 100 g Skinsept mucosy:

1,5g	chlorhexidin diglukonát roztok (20%) (odpovídá 0,3g chlorhexidin diglukonátu)
1,4g	peroxid vodíku (35%)
10,4g (12,4% obj.)	ethanol (96%)

Použití	Množství	Doba expozice
Dutina ústní a hltan vyplachovat (kloktat) 1-2x denně	10-15ml (asi 1 polévková lžíce)	1 minuta
Okolní pokožka genitálií	dostatečně smočít tamponem	1 minuta
Před operačními a diagnostickými zákroky a před cévkováním	dostatečně smočít tamponem	1 minuta

Pokyny pro použití:

- nepoužívat u osob alergických na chlorhexidin a ostatní složky tohoto roztoku
- neaplikovat do očí, zevního zvukovodu a do nosních průduchů
- nepoužívat k dezinfekci ran a jako antiseptikum dutiny břišní
- při opakovaném použití k výplachům dutiny ústní může nastat přechodné zbarvení zubů a jazyka, které vymizí po ukončení používání
- účinnost přípravku snižují mýdla a látky obsažené v zubních pastách
- při výplachu úst a kloktání roztok nepolykejte

Oblast použití:

- udržování hygieny dutiny ústní, ke snížení tvorby zubního povlaku
- neředěný roztok je určen také k jednorázové dezinfekci přilehlé pokožky v oblasti pohlavních orgánů a zevního ústí močové trubice před operačními a diagnostickými zákroky a před cévkováním.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si přečtěte návod k použití a bezpečnostní list!

Doba použitelnosti: 12 měsíců

0,5 l PE EURO láhev