Opalustre™ Enamel Micro-Abrasion Slurry EN

Product Description
Opalustre is a chemical and mechanical abrasion slurry containing 6.6% hydrochloric acid and silicon carbide micro particles that can be rinsed off with water. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)
- 1.2 mL syringe
- Delivery tip
  - White Mac™ Tip
- OpalCups™
  - Bristle
  - Finishing

Composition
- Hydrochloric acid
- Silicon carbide micro particles.

Indications for Use/Intended Purpose
For removal of superficial (<0.2mm depth) imperfections, including mild fluorosis discoloration.

Contraindications
- Do not use on severe fluorosis.
- Do not use on thin enamel.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
- Because of the hydrochloric acid, meticulous isolation is extremely important when using this product.
- Avoid contact with soft tissue. If products come in contact with soft tissue, immediately rinse area thoroughly with water.
- Patient, clinician, and assistant must wear protective eyewear.
- Use only recommended tips.
- Keep away from heat and direct sunlight.
- If rubber dam is not used, follow instructions for OpalDam application.
- If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have the patient consult their physician.

Stepwise Instructions
Preparation
1) It is recommended to take initial photographs for reference.
2) Using rubber dam and clamps, or following instructions for OpalDam/OpalDam Green application, isolate tooth or teeth to be treated along with one tooth adjacent on each side.
3) Remove Luer lock cap from Opalustre syringe and securely attach White Mac™ tip.
4) Verify flow prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check.

Use
1) Apply Opalustre layer over the area to be treated.
2) Using an OpalCups Bristle at a slow RPM (approximately 500 RPM), apply intermittent medium to heavy pressure for approximately 60 seconds per application.
3) Remove the paste with suction then rinse, evaluate if less than 0.2mm has been removed, and repeat as necessary.

Cleanup
1) After final rinse, remove rubber dam, or OpalDam/OpalDam Green. Rinse thoroughly.
2) Use the OpalCups Finishing for surface polishing. A fluoride treatment is also recommended.
3) Take final photos for reference.

NOTE: For post-op sensitivity, potassium nitrate or fluoride varnish products for 30 minutes to 8 hours per day are recommended. Areas of deep hypo-mineralization and some stains may not respond to treatment and may require esthetic bonded restorations. We recommend whitening products to be used prior to Oplaustre treatments as this procedure can sometimes be avoided. If whitening products are used, wait 7-10 days before any esthetic/bonding restorations are placed.

Processing
To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Zahnschmelz Mikro-Abrasionspaste DE

Produktbeschreibung
Opalustre ist eine chemische und mechanische Abrasionspaste, die 6,6% Salzsäure und Siliciumcarbid-Mikropartikel enthält in einer wasserlöslichen Paste. Alle Anleitungen und SDB-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehe

Lieferformen
- 1,2 ml Spritze
- Verabreichungsspitze
  - White Mac™ Tip
- OpalCups™
  - OpalCups Bristle
  - OpalCups Finishing

Zusammensetzung
- Salzsäure
- Siliziumkarbid- Mikropartikel

Gebrauchshinweise / Verwendungszweck
Zum Entfernen von oberflächlichen Zahnschmelzdefekten (<0,2 mm Tiefe), einschließlich leichter Verfärbungen durch Fluorose.

Kontraindikationen
- Nicht bei schwerer Fluorose anwenden.
- Nicht auf dünnem Zahnschmelz anwenden.
- Informationen zu Patienten oder Anwendern mit Allergien finden Sie im Allergendokument unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich mit Wasser aus und lassen Sie den Patienten seinen Arzt konsultieren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
- Aufgrund der Salzsäure ist eine sorgfältige Isolierung bei der Verwendung dieses Produkts äußerst wichtig.
- Kontakt mit Weichgewebe vermeiden. Wenn Produkte mit Weichgewebe in Berührung kommen, spülen Sie den Bereich sofort gründlich mit Wasser aus.
- Patient, Arzt und Assistent müssen eine Schutzbrille tragen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Spitzen.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Wenn kein Kofferdam verwendet wird, befolgen Sie die Anweisungen für die Anwendung von OpalDam.
- Wenn eine allergische Reaktion beobachtet wird, spülen Sie den exponierten Bereich gründlich aus und lassen Sie den Patienten seinen Arzt konsultieren.

Schrittweise Anleitung
Vorbereitung
1) Es wird empfohlen, Fotos vor der Behandlung als Referenz zu machen.
2) Isolieren Sie mit Kofferdam und Klemmen oder gemäß den Anweisungen für die Anwendung von OpalDam / OpalDam Grün den zu behandelnden Zahn oder die zu behandelnden Zähne zusammen mit einem weiteren Zahn auf jeder Seite.
3) Entfernen Sie die Luer-Verschlusskappe von der Opalustre-Spritze und bringen Sie die White Mac™ Tip sicher an.
4) Überprüfen Sie den Durchfluss vor der intraoralen Anwendung. Wenn Sie Widerstand spüren, tauschen Sie die Spitze aus und überprüfen Sie sie erneut.

Gebrauch
1) Tragen Sie die Opalustre-Schicht auf die zu behandelnde Fläche auf.
2) Wenden Sie bei Verwendung einer OpalCups-Bürste mit einer langsamen Drehzahl (ca. 500 U / min) einen zeitweiligen mittleren bis starken Druck für ca. 60 Sekunden pro Anwendung an.
3) Entfernen Sie die Paste durch Absaugen, spülen Sie sie aus, prüfen Sie, ob weniger als 0,2 mm entfernt wurden, und wiederholen Sie dies nach Bedarf.

Säuberung
1) Nach dem letzten Spülen Kofferdam oder OpalDam / OpalDam Grün entfernen. Gründlich ausspülen.
2) Verwenden Sie das OpalCups Finishing zum Polieren der Oberfläche. Eine Fluoridbehandlung wird ebenfalls empfohlen.
3) Machen Sie Fotos nach der Behandlung als Referenz.

HINWEIS: Für die postoperative Empfindlichkeit werden Kaliumnitrat- oder Fluorid-Lackprodukte für 30 Minuten bis 8 Stunden pro Tag empfohlen. Bereiche mit tiefer Hypomineralisierung und einige Flecken sprechen möglicherweise nicht auf die Behandlung an und erfordern möglicherweise ästhetisch Adhesiv Restaurationen. Wir empfehlen, Aufhellungsprodukte vor der Behandlung mit Oplaustre zu verwenden, da dies manchmal vermieden werden kann. Warten Sie bei der Verwendung von Aufhellungsprodukten 7-10 Tage, bevor Sie ästhetische / bindende Restaurationen einsetzen.

Verarbeitung
Die Spritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine Einweg Barriere-Schtzhülle-Schutzhülle verwenden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine Barriere-Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze als Einweg-Spritze behandelt werden.

Lagerung und Entsorgung
Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

Sonstige Angaben
Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Pâte de micro-abrasion amélaire FR

Description du produit
Opalustre est une pâte d'abrasion chimique et mécanique contenant de l'acide chlorhydrique à 6,6% et des microparticules de carbure de silicium pouvant être rincée à l'eau.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application
- Seringue de 1,2 ml
- Embout d'application
  - Embout White Mac™
- OpalCups™
  - Brossette en Poil
  - Finition

Composition
- Acide hydrochlorique
- Microparticules de carbure de silicium

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Pour l'élimination des imperfections superficielles (<0,2 mm de profondeur), y compris une légère décoloration liée à la fluorose.

Contre-indications
- Ne pas utiliser en cas de fluorose grave.
- Ne pas utiliser sur un émail fin.
- Pour les patients ou les utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions
- En raison de l'acide chlorhydrique, une isolation méticuleuse est extrêmement importante lors de l'utilisation de ce produit.
- Éviter le contact avec les tissus mous. Si les produits entrent en contact avec les tissus mous, rincer immédiatement et abondamment la zone à l'eau.
- Le patient, le praticien et doivent porter des lunettes de protection.
- Utiliser exclusivement les embouts recommandés.
- Tenir à l'écart de la chaleur et des rayons directs du soleil.
- Si la digue en caoutchouc n'est pas utilisée, suivez les instructions pour l'application OpalDam.
- En cas de réaction allergique, rincez soigneusement la zone exposée et demandez au patient de consulter son médecin.

Instructions par étapes
Préparation
1) Il est recommandé de prendre des photographies préalablement au traitement pour référence.
2) En utilisant une digue en caoutchouc et des pinces, ou en suivant les instructions pour l'application OpalDam/ OpalDam Green, isoler la ou les dents à traiter, ainsi qu'une dent adjacente de chaque côté.
3) Retirez le capuchon Luer Lock de la seringue Opalustre et fixez solidement l'embout White Mac™.
4) Vérifiez le débit avant l'application intra-orale. Si de la résistance est rencontrée, remplacez l'embout et vérifiez à nouveau.

Utilisation
1) Appliquer la couche Opalustre sur la zone à traiter.
2) En utilisant la brossette en poil OpalCups à faible vitesse de rotation (environ 500 tours/minute), appliquez une pression moyenne à forte intermittente pendant environ 60 secondes par application.
3) Retirez la pâte avec succion puis rincez, évaluez si moins de 0,2 mm a été enlevé et recommencez si nécessaire.

Nettoyage
1) Après le dernier rinçage, retirez la digue en caoutchouc ou OpalDam/OpalDam Green. Rincez abondamment.
2) Utilisez la cupule OpalCups pour le polissage de surface. Un traitement au fluorure est également recommandé.
3) Prenez des photos finales pour référence.

REMARQUE : Pour la sensibilité post-opératoire, il est recommandé d'utiliser des vernis au nitrate de potassium ou au fluorure pendant 30 minutes à 8 heures par jour. Les zones d'hypo-minéralisation profonde et certaines taches peuvent ne pas répondre au traitement et peuvent nécessiter des restaurations esthétiques. Nous recommandons d'utiliser des produits de blanchiment avant les traitements avec Opalustre, car cette procédure peut parfois être évitée. Si des produits de blanchiment sont utilisés, attendez 7 à 10 jours avant de procéder à des restaurations esthétiques collées.

Traitement
Pour éviter toute contamination croisée, essuyez la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utilisez un manchon de protection jetable. Si un manchon de protection n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme à usage unique.

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200.

Opalustre™ Email micro-schuurslurrie NL

Productomschrijving
Opalustre is een chemische en mechanische schuurslurrie die 6,6% zoutzuur en siliciumcarbide-microdeeltjes bevat en die met water kan worden afgespoeld.
Lees voor alle beschreven producten zorgvuldig alle instructies en informatie op het veiligheidsinformatieblad voorafgaand aan gebruik.

Leveringsvorm (en)
- 1,2 ml spuit
- Aanbrengtip
  - Witte Mac™-tip
- OpalCups™
  - Borstel
  - Afwerking

Samenstelling
- Zoutzuur
- Siliciumcarbide microdeeltjes

Indicaties voor gebruik/beoogde doel
Voor het verwijderen van oppervlakkige (<0,2 mm diepte) imperfecties, inclusief milde fluoroseverkleuring.

Contra-indicaties
- Niet gebruiken bij ernstige fluorose.
- Niet gebruiken op dun email.
- Raadpleeg voor patiënten of gebruikers met allergische zorgen het product allergeen document op www.ultradent.com. Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied grondig met water en laat de patiënt zijn arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Vanwege het zuurzout is zorgvuldige isolatie uiterst belangrijk bij gebruik van dit product.
- Vermijd contact met zacht weefsel. Als producten in contact komen met zacht weefsel, spoel het gebied dan onmiddellijk grondig met water.
- Patiënt, arts en assistent moeten een veiligheidsbril dragen.
- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht.
- Als er geen rubberdam wordt gebruikt, volg dan de instructies voor het aanbrengen van OpalDam.
- Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied grondig en laat de patiënt zijn arts raadplegen.

Stapsgewijze instructies
Voorbereiding
1) Het wordt aanbevolen om eerste foto's ter referentie te maken.
2) Gebruik rubberen dam en klemmen of volg de instructies voor het gebruik van OpalDam / OpalDam Groen om de te behandelen tand of tanden te isoleren, samen met één tand aan elke kant.
3) Verwijder de Luer lock-dop van de Opalustre-spuit en bevestig de witte Mac-tip stevig.
4) Controleer de stroom voordat u intra-oraal aanbrengt. Als weerstand wordt ondervonden, de tip vervangen en opnieuw controleren.

Gebruik
1) Breng Opalustre-laag aan op het te behandelen gebied.
2) Gebruik een OpalCups-borstel met een langzame RPM (ongeveer 500 RPM) en oefen ongeveer 60 seconden per aplicatie intermitterende middelmatige tot zware druk uit.
3) Verwijder de pasta met afzuiging, spoel na, evalueer of minder dan 0,2 mm is verwijderd en herhaal indien nodig.

Opruimen
1) Verwijder na de laatste spoeling de rubberdam of OpalDam / OpalDam Groen. Grondig spoelen.
2) Gebruik de OpalCups-afwerking voor polijsten van oppervlakken. Een fluoridebehandeling wordt ook aanbevolen.
3) Neem definitive foto's ter referentie.

OPMERKING: Voor postoperatieve gevoeligheid worden producten van kaliumnitraat of fluoride gedurende 30 minuten tot 8 uur per dag aanbevolen. Gebieden met diepe hypomineralisatie en sommige vlekken reageren mogelijk niet op de behandeling en vereisen mogelijk esthetisch gebonden restauraties. We raden aan om bleksingsproducten te gebruiken voorafgaand aan behandelingen met Oplaustre, omdat deze procedure soms kan worden vermeden. Als bleksingsproducten worden gebruikt, wacht dan 7-10 dagen voordat er esthetische / hechtende restauraties worden geplaatst.

Verwerken
Veeg, om kruisbesmetting te voorkomen, de spuit af met een desinfectiemiddel van gemiddeld niveau tussen verschillende toepassingen en gebruik een barrièrehuls voor eenmalig gebruik. Als een barrièrehuls niet wordt gebruikt, moet de spuit worden behandeld als zijnde voor eenmalig gebruik.

Opslag en verwijdering
Voer afval af volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie
Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Liquido di micro-abrasione smaltato IT

Descrizione del prodotto
Opalustre è un abrasivo chimico e meccanico in pasta contenente il 6,6% di acido cloridrico e micro particelle di carburo di silicio che possono essere risciacquate con acqua.
Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Modalità di erogazione
- Siringa da 1,2 ml
- Puntale di erogazione
  - Puntale Bianco Mac™
- OpalCups™
  - Setola
  - Rifinitura

Composizione
- Acido cloridrico
- Micro particelle di carburo di silicio

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
Per la rimozione di imperfezioni superficiali (<0,2 mm di profondità), incluso lieve discolorazione da fluorosi.

Controindicazioni
- Non usare su fluorosi grave.
- Non utilizzare su smalto sottile.
- Per pazienti o utenti con problemi di allergia, consultare il documento sugli allergeni del prodotto disponibile su www.ultradent.com. Se si osserva una reazione allergica, sciacquare abbondantemente l'area esposta con acqua e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.

Avvertenze e precauzioni
- A causa dell'acido cloridrico, l'isolamento meticoloso è estremamente importante quando si utilizza questo prodotto.
- Evitare il contatto con i tessuti molli. Se i prodotti vengono a contatto con i tessuti molli, sciacquare immediatamente abbondantemente con acqua.
- Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare occhiali protettivi.
- Utilizzare solo suggerimenti consigliati.
- Tenere lontano da fonti di calore e luce solare diretta.
- Se la diga di gomma non viene utilizzata, seguire le istruzioni per l'applicazione OpalDam.
- Se si osserva una reazione allergica, sciacquare abbondantemente l'area esposta e chiedere al paziente di consultare il proprio medico.

Procedure di utilizzo
Preparazione
1) Si consiglia di scattare le fotografie iniziali come riferimento.
2) Usando la diga di gomma e i ganci o seguendo le istruzioni per l'applicazione OpalDam / OpalDam Green, isolare il dente o i denti da trattare insieme a un ulteriore dente adiacente su ciascun lato.
3) Rimuovere il cappuccio Luer lock dalla siringa Opalustre e fissare saldamente la punta Mac bianco.
4) Verificare il flusso in uscita prima dell'applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire la punta e ricontrollare.

Uso
1) Applicare lo strato di Opalustre sull'area da trattare.
2) Utilizzando una setola OpalCups a basso numero di giri (circa 500 giri / min), applicare una pressione intermittente da media a forte per circa 60 secondi per applicazione.
3) Rimuovere la pasta con l'aspirazione, quindi risciacquare, valutare se è stato rimosso meno di 0,2 mm e ripetere se necessario.

Pulizia
1) Dopo il risciacquo finale, rimuovere la diga di gomma o OpalDam / OpalDam Green. Risciacquare abbondantemente.
2) Utilizzare la finitura OpalCups per la lucidatura della superficie. Si raccomanda anche un trattamento al fluoro.
3) Scattare le foto finali come riferimento.

NOTA: Per la sensibilità post-operatoria, si consigliano prodotti con nitrato di potassio o vernice al fluoruro per 30 minuti per 8 ore al giorno. Le aree di ipo-mineralizzazione profonda e alcune macchie potrebbero non rispondere al trattamento e potrebbero richiedere restauri estetici legati. Raccomandiamo di utilizzare prodotti sbiancanti prima dei trattamenti con Oplaustre poiché quest'ultima procedura può talvolta essere evitata. Se si utilizzano prodotti sbiancanti, attendere 7-10 giorni prima di effettuare qualsiasi restauro estetico / adesivo.

Trattamento
Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva, la siringa deve essere trattata come monouso.

Conservazione e smaltimento
Smaltire i rifiuti secondo le regole, le linee guida e i regolamenti locali.

Informazioni varie
Segnalare qualsiasi incidente grave al fabbricante e all'autorità competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Suspensión para la micro abrasión del esmalte ES

Descripción del producto
Opalustre es una suspensión de abrasión química y mecánica que contiene ácido clorhídrico al 6.6 % y microparticulas de carburo de silicio que se pueden enjuagar con agua.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

Forma de administración
- Jeringa de 1.2 ml
- Punta de administración
  - Punta Mac™ Blanca
- OpalCups™
  - Cepillo
  - Acabado

Composición
- Ácido clorhídrico
- Microparticulas de carburo de silicio

Indicaciones de uso/Fin previsto
Para la eliminación de imperfecciones superficiales (<0.2 mm de profundidad), incluida decoloración leve por fluorosis.

Contraindicaciones
- No usar en fluorosis severa.
- No utilizar en esmalte fino.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
- Debido al ácido clorhídrico, un aislamiento meticuloso es extremadamente importante cuando se usa este producto.
- Evitar el contacto con el tejido blando. Si los productos entran en contacto con el tejido blando, enjuague inmediatamente el área con abundante agua.
- El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras.
- Utilice solo las puntas recomendadas.
- Mantener alejado del calor y la luz solar directa.
- Si no se usa el dique de goma, siga las instrucciones para la aplicación OpalDam.
- Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta y haga que el paciente consulte a su médico.

Instrucciones paso a paso
Preparación
1) Se recomienda tomar fotografías iniciales como referencia.
2) Usando diques de goma y pinzas, o siguiendo las instrucciones para la aplicación OpalDam / OpalDam Verde, aísle el diente o dientes a tratar junto con un diente adyacente a cada lado.
3) Retire la tapa de bloqueo Luer de la jeringa Opalustre y conecte de forma segura la punta Mac Blanca.
4) Verifique el flujo antes de aplicarlo intraoralmente. Si se encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar.

Uso
1) Aplique una capa de Opalustre sobre el área a tratar.
2) Usando un cepillo OpalCups a pocas RMP (aproximadamente 500 RPM), aplique presión intermitente de media a fuerte durante aproximadamente 60 segundos por aplicación.
3) Retire la pasta con succión y luego enjuague, evalúe si se ha eliminado menos de 0.2 mm y repita según sea necesario.

Limpieza
1) Después del enjuague final, retire el dique de goma o el OpalDam / OpalDam Verde. Enjuague bien.
2) Utilice el cepillo de acabado OpalCups para pulir la superficie. También se recomienda un tratamiento con flúor.
3) Tome las fotos finales como referencia.

NOTA: Para la sensibilidad postoperatoria, se recomiendan productos de barniz de nitrato de potasio o flúor durante 30 minutos a 8 horas por día. Las áreas de hipomineralización profunda y algunas manchas pueden no responder al tratamiento y pueden requerir restauraciones estéticas. Recomendamos usar productos de blanqueamiento antes de los tratamientos con Opalustre, ya que este procedimiento a veces se puede evitar. Si se utilizan productos de blanqueamiento, espere de 7 a 10 días antes de colocar cualquier restauración estética / adhesiva.

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre usos, y use una funda de barrera desechable. Si no se usa una funda de barrera, la jeringa debe tratarse como de un solo uso.

Almacenamiento y eliminación
Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información variada
Reporte cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Pasta semifluida para a microabrasão de esmalte PT

Descrição do Produto
Opalustre é uma suspensão abrasiva química e mecânica contendo ácido cloridrico a 6,6% e microparticulas de carboneto de silício que podem ser enxaguadas com água.
Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas FDS antes de usar.

Formas de aplicação
- Seringa de 1,2 mL
- Pontas de aplicação:
  - Ponta Mac™ Branca
- OpalCups™
  - Cerda
  - Acabamento

Composição
- Ácido clorídrico
- Microparticulas de carboneto de silício

Indicações de utilização/Utilização prevista
Para remoção de imperfeições superficiais (<0,2 mm de profundidade), incluindo descoloração leve da fluorose.

Contraindicações
- Não use em fluorose severa.
- Não use em esmalte fino.
- Para pacientes ou usuários com alergias, consulte o documento sobre alérgenos do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.

Advertências e precauções
- Na utilização deste produto o isolamento meticuloso é extremamente importante devido ao ácido clorídrico.
- Evite o contacto com tecidos moles. Se o produto entrar em contacto com qualquer tecido mole, lavar imediatamente a área com água abundante.
- O paciente, o clínico e o assistente devem usar óculos de proteção.
- Utilizar apenas as pontas recomendadas.
- Manter longe de fontes de calor e da luz solar direta.
- Se o dique de borracha não for usado, siga as instruções para a aplicação do OpalDam.
- Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta e peça ao paciente para consultar o seu médico.

Instruções passo a passo
Preparação
1) Recomenda-se tirar fotos iniciais para referência.
2) Usando um dique de borracha e grampos, ou seguindo as instruções para a aplicação do OpalDam/OpalDam Verde, isole o dente ou os dentes a serem tratados juntamente com um dente adjacente de cada lado.
3) Retire a tampa Luer lock da seringa Opalustre e aplique a ponta Mac Branca.
4) Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral. No caso de sentir resistência, substitua a ponta e verifique novamente.

Utilização
1) Aplique uma camada de Opalustre sobre a área a ser tratada.
2) Usando uma Cerda OpalCups a uma velocidade lenta (aproximadamente 500 rpm), aplique uma pressão média a forte intermitente durante 60 segundos por aplicação.
3) Remova a pasta com sucção, em seguida, enxagúe, avalie se menos de 0,2 mm foi removido e repita conforme necessário.

Limpeza
1) Após o enxaguamento final, retire o dique de borracha ou o OpalDam/ OpalDam Verde. Enxagúe abundantemente.
2) Use o acabamento OpalCups para polimento da superfície. Um tratamento com flúor também é recomendado.
3) Tire fotos finais para referência.

NOTA: Para a sensibilidade pós-intervenção recomenda-se a utilização de produtos à base de verniz de nitrato de potássio ou flúor durante 30 minutos a 8 horas por dia. As áreas de hipomineralização profunda e algumas manchas poderão não responder ao tratamento e poderão exigir restaurações estéticas adesivas. Recomendamos a utilização de produtos branqueadores antes dos tratamentos com Oplaustre, pois este procedimento pode ser muitas vezes evitado. Se forem utilizados produtos de branqueadores, aguardar 7-10 dias antes de colocar quaisquer restaurações estéticas/aderentes.

Processamento
Para evitar a contaminação cruzada, limpe a seringa com um desinfectante de nível intermédio entre as utilizações e utilize uma manga de barreira descartável. Se não for usada uma manga de barreira, a seringa deve ser tratada como de uso único.

Armazenamento e Eliminação
Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações diversas
Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Abrasions medel för emalj SV

Produktbeskrivning
Opalustre är ett kemiskt och mekaniskt Abrasions medel som innehåller 6,6% saltsyra och mikropartiklar av kiselkarbid som kan sköljas av med vatten.
Se till att du noggrant läser och förstår alla anvisningar och SDS-information före användning av samtliga produkter.

Leveransformulär
- 1,2 ml spruta
- Sprutspets
  - Vit Mac™-spets
- OpalCups™
  - Borst
  - Efterbehandling

Sammansättning
- Saltsyra
- Mikropartiklar av kiselkarbid

Indikationer för användning / avsett syfte
För avlägsnande av ytliga defekter (<0,2 mm djup), inklusive missfärgning på grund av mild fluoros.

Kontraindikationer
- Använd inte vid svår fluoros.
- Använd inte på tunn emalj.
- För patienter eller användare med allergiproblem, se produkt allergen dokument som finns på www.ultradent.com. Om allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området noggrant med vatten och låt patienten rådfråga sin läkare.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- På grund av saltsyran är noggrann isolering mycket viktig vid användning av denna produkt.
- Undvik kontakt med mjukvävnad. Om produkter kommer i kontakt med mjukvävnad, ska området sköljas omedelbart med vatten.
- Patient, kliniker och assistent måste bära skyddsglasögon.
- Använd endast rekommenderade spetsar.
- Håll bort från värme och direkt solljus.
- Om kofferdam inte används, följ anvisningarna för OpalDam.
- Om allergisk reaktion observeras, skölj noggrant det berörda området och låt patienten söka hjälp från läkare.

Stegvisa instruktioner
Förberedelse
1) Det rekommenderas att ta bilder före behandling att ha som referens.
2) Kofferdam kummi ja klammerite abil või järgides OpalDami/ OpalDam Green pealekandmiseks antud juhiseid, eraldage ravitav hammas või hammaste piirkond nii et mõlemale küljele jääb üks külgnev hammas.
3) Eemaldage Opalustre süstalt Lueri lukustuskork ja kinnitage Valge Mac kanüül tugevalt.
4) Enne intraoraalset manustamist kontrollige toote voolavust. Kui tuvastate takistuse, vahetage kanüül ja proovige uuesti.

Kasutamine
1) Kandke töödeldavale pinnale Opalustre kiht.
2) Käivitage OpalCups harjased aeglastel pööretel (umbes 500 p/min), rakendage igal peaklemmisel aeg 60 sekundi jooksul vahelduvalt keskmist ja tugevat survet.
3) Eemaldage pasta imuriga, seejärel loputage, hinnake, kas eemaldatud on vähem kui 0,2 mm ja vajadusel korrake toimingut.

Puhastamine
1) Pärast lõplikku loputamist eemaldage kofferdami kumm või OpalDam/OpalDam Green. Loputage hoolikalt.
2) Pinna poleerimiseks kasutage OpalCups harju.
3) Lisaks soovitame pinda töödelda ka fluoriidiga.
4) Tehke lõpufotod viitamiseks.

MÄRKUS: Postoperatiivse tundlikkuse puhul on soovitav kanda hambale iga päev 30 minutiks kuni 8 tunniks kaaliumnitraati või fluoriidlakki. Sügava hüpomineraliseerimise piirkonnad ja mõned plekid ei pruugi ravile reageeriva ja nende ravimiseks võib olla vajalik uus sprotseduur või asetada täidis. Enne Oplaustre ravi soovitame teha valgenduskuure Opalescencega, kuna mõnel juhul võib Opalustre-ravi ebavajalikuks osutuda. Kui kasutate valgendavaid tooteid, oodake 7-10 päeva, enne kui soovite hambaid täidisega katta.

Töötlemine
Ristsaastumise vältimiseks pühkige süstalt kasutuskordade vahel keskmise taseme desinfitseerimisvahendiga ja kasutage ühekordselt kasutatavat kaitset. Kui te kaitset ei kasuta, tuleb süstalt käsitleda ühekordselt kasutatava vahendina.

Ladustamine ja kõrvaldamine
Järgige kohalikke jäätmekäitlusega seotud eeskirju, juhiseid ja määrusid.

Mitmesugune teave
Teavitage rasketest õnnetustest tootjat ja pädevat asutust.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Produkt til emaljemikroabrasion DA

Produktbeskrivelse
Opalustre er en kemisk og mekanisk sammensætning, der indeholder 6,6 % saltsyre og siliciumcarbid-mikropartikler, som kan skylles væk med vand.
For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt før brug.

Leveringsformular(er)
- 1,2 ml sprøjte
- Leveringsspids
  - Hvid Mac™-spids
- OpalCups™
  - Børste
  - Efterbehandling

Sammensætning
- Saltsyre
- Mikropartikler af silciumcarbid

Indikationer for brug/tilsigtet formål
Til fjernelse af overfladiske (<0,2 mm dybde) ufuldkommenheder, inklusive mild misfarvning fra fluorose.

Kontraindikationer
- Må ikke anvendes ved svær fluorose.
- Brug ikke på tynd emalje.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokument, som findes på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion, skyl det eksponerede område grundigt med vand, og lad patienten konsultere deres læge.

Advarsler og forholdsregler
- På grund af saltsyren er omhyggelig isolering ekstremt vigtig ved brug af dette produkt.
- Undgå kontakt med blødt væv. Hvis produkter kommer i kontakt med blødt væv, skal området straks skylles grundigt med vand.
- Patient, klinikker og assistent skal bære beskyttelsesbriller.
- Der må kun anvendes anbefalede spidser.
- Holdes væk fra varme og direkte sollys.
- Hvis der ikke bruges gummiafskærmning, skal du følge instruktionerne for anvendelse af OpalDam.
- Hvis der observeres en allergisk reaktion, skal det eksponerede område skylles grundigt, og lad patienten konsultere deres læge.

Trinvise instruktioner
Forberedelse
1) Det anbefales at tage indledende fotografier til reference.
2) Brug gummiafskærmninger og klemmer eller følg instruktionerne for OpalDam/OpalDam Grøn påføring til at isolere den tand eller de tænder, der skal behandles sammen med den tilstødende tand på hver side.
3) Fjern Luer-låsehætten fra Opalustre-sprøjten, og fastgør Hvid Mac-spidsen sikkert.
4) Kontrollér gennemstrømningen inden intraoral anvendelse. Hvis der forekommer modstand, skal spidsen udskiftes og kontrolleres igen.

Brug
1) Påfør Opalustre-laget på det område, der skal behandles.
2) Brug en OpalCups-børste ved et lavt omdrejningstal (ca. 500 omdrejninger pr. minut), og påfør skiftevis medium til kraftigt tryk i ca. 60 sekunder pr. påføring.
3) Fjern gummiafskærmningen med sug, skyl derefter, vurdér om mindre end 0,2 mm er blevet fjernet, og gentag om nødvendigt.

Rengøring
1) Efter endelig skylning skal gummiafskærmningen eller OpalDam/OpalDam Grøn fjernes. Skyl grundigt.
2) Brug OpalCups Finishing til overfladepolering. Der anbefales også en fluorbehandling.
3) Tag endelige fotos til reference.

BEMÆRK: Ved post-operativ følsomhed anbefales kaliumnitrat eller fluoridlakprodukter i 30 minutter til 8 timer pr. dag. Områder med dyb hypo-mineralisering og nogle pletter reagerer muligvis ikke på behandlingen og kan kræve æstetiske tandrestaureringer. Vi anbefaler, at blegningsprodukter anvendes forud for Oplaustre-behandlinger, da denne procedure undertiden kan undgås. Hvis der bruges blegningsprodukter, skal der gå 7-10 dage, inden der er foretages æstetiske/klæbende restaureringer.

Behandling
For at undgå krydskontaminering, skal sprøjten tørres med et middelniveaudrift desinfektionsmiddel mellem brug og der skal bruges et barrierehylster til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes et barrierehylster, skal sprøjten behandles som engangsbrug.

Opbevaring og bortskaffelse
Affald skal bortskaffes i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapportér enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Hienojakoinen hankaustahna emalille FI

Tuotekuvaus
Opalustre on kemiallinen ja mekaaninen hankaustahna, joka koostuu 6,6-prosenttisesta suolahappoliuoksesta ja piikarbidimikrohiukkasista. Tahna voidaan huuhdella pois vedellä.
Lue kaikki ohjeet sekä käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja sisäistä ne ennen kyseisten tuotteiden käyttöä.

Annostelumuoto (-muodot)
- 1,2 ml:

Opalustre™ Zománc mikrotöréses iszap HU

Termék leírása
Az Opalustre egy kémiai és mechanikus koptatóiszap, amely 6,6% sósavat és szilícium-karbid mikrorészecskéket tartalmaz, ezek vízzel dilluthatók.
Minden leírt termék használata előtt gondosan olvassa el és értse meg az utasításokat és a biztonsági adatlap információit.

Szállítás formája
- 1,2 ml fecskendő
- Szálllított hegy
  - „Fehér Mac™" hegy
- OpalCups™
  - Sörte
  - Befejezés

Összetétel
- Sósav
- Szilícium-karbid mikrorészecskék

Javallatok/Szándékolt cél
Felületes (<0,2 mm mélységű) hányosságok eltávolítására, beleértve az enyhe fluorózis elsznesződést.

Ellenjavallatok
- Ne használja súlyos fluorózis esetén.
- Ne használja vékony zománcon.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy felhasználók számára olvassa el a termék-allergén dokumentumot, amely a www.ultradent.com weboldalon érhető el. Ha allergiás reakciót észlel, alaposan öblítse le a kitett területet vízzel, és kérdezze meg a beteget orvosával.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A sósav miatt a pontos elszigetelés rendkívül fontos a termék használatakor.
- Kerülje az érintkezést a puha szövetekkel. Ha a termékek puha szövetekkel érintkeznek, azonnal alaposan öblítse le a területet vízzel.
- A betegnek az orvosnak és az asszistensnek védőszemüveget kell viselnie.
- Csak a javasolt hegyeket használja.
- Tartsa távol hőtől és közvetlen napfénytől.
- Ha nem használ gumi ujjatat, akkor kövesse az OpalDam alkalmazás útmutatóját.
- Ha allergiás reakciót észlel, alaposan öblítse le a kitett területet, és kérje a beteget, hogy forduljon orvosához.

Lépésenkénti utasítások

Előkészítés
1) Javasoljuk, hogy készítsen kezdeti fényképeket referenciákénti.
2) Gumi gáttal és bilincsekkel, vagy az OpalDam / Zöld OpalDamn alkalmazásra vonatkozó utasításokat követve izolálja a kezelendő fogat vagy fogakat, mindkét oldalán, a szomszédos fogakkal együtt.
3) Távolítsa el a Opalustre zár alól a fogat. Az Opalustre fecskendőről és biztonságosan rögzítse a Fehér Mac hegyét.
4) Az intraorális alkalmazás előtt ellenőrizze az áramlást. Ha elakadást tapasztal, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

Felhasználás
1) Helyezze az Opalustre réteget a kezelendő felületre.
2) OpalCups sörte használatával lassú fordulatszámon (kb. 500 ford / perc), kenjen zakaszos közeget nagy nyomásig kb. 60 másodpercig alkalmazásonként.
3) Távolítsa el a pasztát szívással, majd öblítse le, mérje fel, ha eltávolított kevesebb mint 0,2 mm-t, és ismételje meg, ha szükséges.

Tisztítás
1) A végső öblítés után távolítsa el a gumidugót vagy az OpalDam/Zöld OpalDam anyagot. Alaposan öblítse le.
2) A felület polírozásához használja az OpalCups polírozás alkalmazást. Fluoridos kezelés is javasolt.
3) Készítsen végleges fotókat referenciákért.

MEGJEGYZÉS: A műfét utáni érzékenység érdekében kálium-nitrát vagy fluorid tak termékek ajánlottak naponta 30 percről 8 óráig. A mély hipo-mineralizáció területi és egyes foltok nem reagálnak a kezelésre, és esztétikai kötést igényelhetnek. Fehérítő termékeket javasolunk az Opalustre kezelések előtt, mivel ez az eljárás néha felerősítheti. Fehérítő termékek használata esetén várjon 7-10 napot, mielőtt minden esztétikai / kötőanyag-helyreállítást elvégeznek.

Kezelés
A kereszteznyeződés elkerülése érdekében törölje le a fecskendőt egy szivacs szintű fertőtlenítőszerrel a fecskendőt kizárólag a fehérítőanyagokkal kell viselnie.
Csak egyszer használja.
Az Opalustre nem ajánlott a fogak fehérítésére.

Figyelmeztetés
Ne szúrja le a fecskendőt a puha szövetekbe.

Tárolás és árfaltalmatlanítás
A hulladékot a helyi szabályok, irányelvek és előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Vegyes információk
Jelentsen minden súlyos esetet a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Emaljas mikroabrazīvā suspensija LV

Produkta apraksts
Opalustre ir ķīmiskas un mehāniskas abrāzijas suspensija, kas satur 6,6% sālskābes un silīcija karbīda mikrodaļiņas, kuras var noskalot ar ūdeni.
Attiecīgās mākslīgās apakšstruktūras produktiem pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet un saprotiet visas instrukcijas un drošības datu lapas informāciju.

Piegādes forma (-as)
- 1,2 ml šļirce
- Piegādes gals
  - Balts Mac™ gals
- OpalCups™
  - Birste
  - Apdare

Sastāvs
- Sālskābe
- Silīcija karbīda mikrodaļiņas

Lietošanas indikācijas / nolūks
Virsputeņu (<0,2 mm dziļumā) nepilnību, tostarp vieglas fluorozes krāsas zuduma likvidēšanai.

Kontrindikācijas
- Nelietot smagas fluorozes gadījumā.
- Nelietot uz plānas emaļas.
- Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alerģiju, skatiet produktu alergēnu dokumentu, kas pieejams vietnē www.ultradent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni un lieciet pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sālskābes dēļ, izmantojot šo produktu, ļoti svarīga ir rūpīga izolācija.
- Nepieļaujiet saskari ar mīkstajiem audiem. Ja produkti nonāk saskarē ar mīkstajiem audiem, skartā zona nekavējoties rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.
- Pacientam, ārstam un palīgam ir jāvalka aizsargbrilles.
- Lietojiet tikai ieteiktos uzgaļus.
- Sargāt no karstuma un tiešām saules stariem.
- Ja netiek izmantota cita gumijas barjera, izpildiet OpalDam lietošanas norādījumus.
- Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rūpīgi jāizskalo ietekmējuši pakļautā vieta un jālūdz pacientam konsultēties ar ārstu.

Pakāpeniski norādījumi

Sagatavošana
1) Atsaucei ieteicams uzņemt sākotnējās fotogrāfijas.
2) Izmantojot gumijas barjeru un spailes vai izpildot OpalDam / zalā OpalDam lietošanas norādījumus, izolējiet apstrādājamo zobu vai zobus kopā ar vienu zobu, kas atrodas blakus abās pusēs.
3) Noņemiet Opalustre šļirces Luera tipa blokēšanas vāciņu un drošā pieslēgpriekš balto Mac galu.
4) Pirms intraorālās lietošanas pārbaudiet plūsmu. Ja konstatējat pretestību, nomainiet galu un pārbaudiet vēlreiz.

Izmantot
1) Uzklājiet uz apstrādājamās vietas Opalustre.
2) Izmantojot OpalCups birstīti ar lēniem apgriezieniem (aptuveni 500 apgr./min.), apmēram 60 sekundes uz katru elementu noņemiet pārmērīgi vidēju līdz lielu spiedienu.
3) Ar atsūkšanas metodi noņemiet pastu, pēc tam noskalojiet un novērtējiet, vai ir noņemts mazāk nekā 0,2 mm, un atkārtojiet šo darbību pēc vajadzības.

Tīrīšana
1) Pēc pēdējās skalošanas noņemiet gumijas barjeru vai OpalDam / zalo OpalDam. Rūpīgi izskalojiet.
2) Virsmu pulēšanai izmantojiet OpalCups birstīti. Ieteicama arī apstrāde ar fluoru.
3) Atsauces nolūkā uzņemiet noslēguma fotogrāfijas.

PIEZĪME: Pēcoperācijas jutīguma nodrošināšanai ir ieteicams 30 minūšu laikā 8 stundām dienā izmantot kālija nitrāta vai fluora lakas. Zonas, kur ir dziļa hipomineralizācija un traipi, var nereagēt uz apstrādi, un tām var būt nepieciešama estētiskā izskata atjaunošana. Mēs iesakām pirms Opalustre procedūrām lietot balināšanas produktus, jo daļēji no šīs procedūras var izvairīties. Ja tiek izmantoti balināšanas līdzekļi, nogaidiet 7-10 dienas, pirms tiek veikta estētiskā izskata atjaunošana.

Apstrāde
Lai izvairītos no savstarpējas ietekšanās, noslaukiet šļirci ar vidēja līmeņa dezinfekcijas līdzekli starp lietojumiem un izmantojiet vienreizējo barjeras uzmavu. Ja neizmanto barjeru, šļirce jāuzskata par vienreizējas lietošanas.

Uzglabāšana un likvidēšana
Atkritumus izniciniet atbilstoši vietējiem noteikumiem, vadlīnijām un noteikumiem.

Dažāda informācija
Ziņojiet par jebkuru nopietnu incidentu ražotājam un kompetentajai iestādei.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Emalio mikroabrazijos pasta LT

Gaminio aprašymas
„Opalustre" – cheminės ir mechaninės abrazijos pasta, kuriuje yra 6,6 % druskos rūgšties ir silicio karbido mikrodaleliių, kurias galima nuplauti vandeniu.
Prieš naudodami visas aprašytais gaminiais atidžiai perskaitykite ir įsisąmoninkite visas instrukcijas ir SDL informaciją.

Pristatymo forma (-os)
- 1,2 ml šviritės
- Švirkščiamasis galiukas
  - Baltasis „Mac™" antgalis
- „OpalCups™"
  - Su šereliais
  - Poliravimo

Sudėtis
- Druskos rūgštis
- Silicio karbido mikrodaleliės

Naudojimo indikacijos / numatytojai paskirtis
Paslaitnt paviršinius (<0,2 mm gylio) trūkumus, iškaitant nedidelį spalvos pasikeitimą dėl fluorozės.

Kontraindikacijos
- Nenaudoti esant sunkiai fluorozei.
- Nenaudokite ant plono emalio sluoksnio.
- Pacientams ar vartotojams, turiniems alergijos problemų, skaitykite produktų alergenų dokumentus, kuriuos galite rasti tinklaipsyje www.ultradent.com. Jei pastebėsite alergine reakciją, atsargiai nuplaukite paveikta vietą vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
- Dėl sudėtyje esančios druskos rūgšties gamintį naudojant labai svarbi kruopšti izoliacija.
- Venkite sąlyčio su minkštaisiais audiniais. Gaminiui susilietus su minkštais audiniais nedelsdami kruopščiai nuplaukite juos vandeniu.
- Pacientas, gydytojas ir padėjėjas privalo užsidėti apsaugines akiniuos.
- Naudokite tik rekomenduojamus antgalius.
- Laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Jei nenaudojate koferdamo, vadovaukites „OpalDam" naudojimo instrukcija.
- Pastebėję alerginę reakciją atsargiai nuplaukite paveiktą vietą ir nurodykite pacientui pasitarti su gydytoju.

Nuoseklios instrukcijos

Paruošimas
1) Rekomendujama informacijos tikslais padaryti pradines nuotraukas.
2) Naudodami koferdamą ir spaustukus arba laikydamiesi „OpalDam" / Žalioja „OpalDam" naudojimo instrukciją izoliuokite valomus dantis kartu su vienu šalia esančiu dantimi (iš kiekvienos pusės).
3) Nuo „Opalustre" švirkšto nuimkite fiksuojamąjį „Luer" dangtelį ir gerai pritvirtinkite baltąjį „Mac" antgalį.
4) Prieš naudodami burnos ertmėje patikrinkite srautą. Jei jaučiate pasipriešinimą, antgalį pakeiskite ir patikrinkite iš naujo.

Naudojimas
1) Toje zonoje, kuria ketinate valyti, užtepkite „Opalustre" sluoksnį.
2) Naudodamas „OpalCups" su šereliais lėtai (maždaug 500 sūk./min ar greičiu) maždaug 60 sekundžių kiekvieną vietą, vidutiniškai arba stipriai spausdami.
3) Pastą nusiurbkite, tada nuplaukite, patikrinkite, ar buvo pašalintas ploneesnis nei 0,2 mm emalio sluoksnis, ir, jei reikia, pakartokite.

Valymas
1) Po paskutinio skalavimo nuimkite koferdamą arba „OpalDam" / Žaliąjį „OpalDam". Gerai išskalauke.
2) Paviršių poliruokite poliruojamaisiais „OpalCups". Taip pat rekomenduojama apdoroti fluoru.
3) Informacijos sumetimais padarykite galutines nuotraukas.

PASTABA. Po procedūros dantys gali būti jautrūs, todėl rekomenduojama nuo 30 minučių iki 8 valandų per dieną naudoti kalio nitrato arba fluoridio laką. Gilios hipomineralizacijos zjre ir kai kurios dėmės gali į procedūrą nereaguoti, todėl gali būti reikalinga estetinės restauracijos procedūra. Balinimo procedūrų rekomenduojama atlikti prieš procedūrą su „Opalustre", nes kartais šios procedūros galima išvengti. Jei naudojamos balinamosios priemonės, 7–10 dienų palaukite, kol bus atliktos visos estetinės restauracijos procedūros.

Apdorojimas
Siekiant išvengti kryžminio užšikretimo, prieš naudojimą ir po jo švirkštą reikia nuvalyti vidutinio lygio dezinfekuojamu priemonė i naudoti vienkartinę barjerinę movą. Jei barjerinė mova nenaudojama, Švirkštas laikomas vienkartiniu.

Laikymas ir šalinimas
Atliekas šalinkite pagal vietines taisykles, gaires ir reglamentus.

Įvairi informacija
Apie kiekvieną rimtą incidentą būtina pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Tahlita Likwida Mikro-Abrażiva tal-Enamel MT

Deskrizzjoni tal-Prodott
Opalustre huwa tahlita likwida għal abrażjoni kimika u mekkanika li fiha 6.6% aċċid idrokloriku u mikro-partiċelli tal-karbur tas-silikon li jistgħu jitħalluhu bl-ilma.
Qabel prodotti bħalha deskritti, aqra sew u ifhem l-istruzzjonijiet kollha u l-informazzjoni SDS qabel l-użu.

Forma(Forom) tal-Applikazzjoni
- Siringa ta' 1.2 ml.
- Punta tal-applikazzjoni
  - Punta Bajda Mac™
- OpalCups™
  - Lanzita
  - Irfinar

Kompożizzjoni
- Aċidu idrokloriku
- Mikro-partiċelli tal-karbur tas-silikon

Indikazzjonijiet għall-Użu/ Għan Maħsub
Għat-tneħħija ta' imperfezzjonijiet superfiċjali (<0.2mm fond), inkluża skulurazzjoni ħafifa tal-fluorosi.

Kontra-indikazzjonijiet
- Tużax fuq fluorosi severa.
- Tużax fuq enamel irqiq.
- Għal pazjenti jew utenti bi ħassiġ dwar allerġija, irreferi għad-dokument dwar l-allerġeni disponibbli fuq www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ iż-żona esposta sewwa bl-ilma u ara lil l-pazjent ikkonsulta lil-tabib tagħhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Minħabba l-aċidu idrokloriku, l-iżolament metikuloż huwa importanti ħafna meta jintuża dan il-prodott.
- Evita l-kuntatt ma' tessut artab. Jekk il-prodotti jiġu f'kuntatt ma' tessut artab, laħlaħ sewwa ż-żona bl-ilma immedjatament.
- Pazjent, klinika, u assistent iridi jilbes nuċċali protettiv.
- Użu biss ponot irrakkomandati.
- Żommu fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.
- Żommu l-bogħod mis-sħana u mix-xemx diretta.
- Jekk ma tużużx id-diga tal-gomma, segwi l-istruzzjonijiet ġħall-applikazzjoni ta' OpalDam.
- Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ iż-żona esposta sewwa u ara lil l-pazjent jikkonsulta lil-tabib tiegħu.

Istruzzjonijiet bil-Passi

Preparazzjoni
1) Huwa rakkomandat li tieħu ritratti inizjali għal referenza.
2) Meta tużu diga tal-gomma u klampi, jew segwi l-istruzzjonijiet ġħall-applikazzjoni ta' OpalDam / OpalDam Green, ċoċa s-sinna jew is-snien li ġħandhom jiġu trattati flimkien ma' sinna waħda li timiss fuq kull naħa.
3) Neħħi l-ġħatu tal-iżolaġġ ta' Luer mis-siringa Opalustre u waħħal sew il-ponta Bajda Mac.
4) Iwerifika n-nixxiegħa qabel ma tapplika intraoraalment. Jekk tiltaqa' ma' xi reżistenza, ibdel il-punta u erġa' ċekkja.

Użu
1) Applika saff Opalustre fuq iż-żona li ġħandha tiġi ttrattata.
2) Bl-użu ta' Lanzita OpalCups b'RPM bil-mod (madwar 500 RPM), applika pressjoni intermittenti ġħal pressjoni tqila ġħal madwar 60 sekonda ġħal kull applikazzjoni.
3) Neħħi l-pasta bil-ġbid u mbagħad laħlaħ, evalwa jekk tneħħiex inqas minn 0.2mm, u rripeti kif meħtieġ.

Tindif
1) Ħaġa t-tlaħlaħ finali, neħħi d-diga tal-gomma, jew OpalDam/OpalDam Ħadar. Laħlaħ sewwa.
2) Uża l-OpalCups Finishing ġħal-illustrar tal-wiċċ. Trattament tal-fluworidu huwa wkoll rakkomandat.
3) Ħu ritratti finali ġħar-referenza.

NOTA: Ġħal sensitività ta' wara l-operazzjoni, prodotti ta' nitrat ta' potassjum jew xemmi' dwar l-allerġeni disponibbli fuq www.ultradent.com. Jekk tiġi osservata reazzjoni allerġika, laħlaħ iż-żona esposta sewwa bl-ilma u ara lil l-pazjent ikkonsulta lil-tabib tagħhom.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
- Żewġ metodi ta zawrtastć kwazu chlorowodorowego podczas stosowania tego produktu kluczowe znaczenie ma skrupulatna izolacja.
- Uniikać kontaktu z miękką tkanką. Jeśli produkty zetkną się z tkanką miękką, natychmiast dokładnie spłukać obszar wodą.
- Pacjent, lekarz i asystent muszą nosić okulary ochronne.
- Używać tylko zalecanych końcówek.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Jeśli nie jest używany koferdam, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nakładania OpalDam.
- W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej dokładnie wypłukać narażony obszar i skonsultować się z lekarzem.

Szczegółowe instrukcje

Opalustre™ Zawiesina mikrościerająca do szkliwa PL

Opis produktu
Opalustre to chemiczna i mechaniczna zawiesina ścierająca zawierająca 6,6% kwasu chlorowodorowego i mikrocząstki węglika krzemu, którą można spłukać wodą.
W przypadku wszystkich opisanych produktów przed użyciem należy uważnie przeczytać z zrozumieć wszystkie instrukcje i karty charakterystyki.

Postać dostarczana
- Strzykawka 1,2 ml
- Końcówka do nakładania
  - Biała końcówka Mac™
- OpalCups™
  - Włosie
  - Do wykańczania

Skład
- Kwas chlorowodorowy
- Mikrocząstecki węglika krzemu

Wskazania do stosowania/ przeznaczenie
Do usuwania powierzchownych (< 0,2 mm głębokości) niedoskonałości, w tym łagodnych przebarwień związanych z fluorozą.

Przeciwwskazania
- Nie stosować w przypadku ciężkiej zmiany fluorozowej.
- Nie stosować na cienkiej warstwie szkliwa.
- Dla pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi, zapoznaj się z dokumentem dotyczącym alergenów produktu dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej przepłukać dokładnie odsłonięty obszar woda i poprosić pacjenta o konsultację z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Ze względu na zawartość kwasu chlorowodorowego podczas stosowania tego produktu kluczowe znaczenie ma skrupulatna izolacja.
- Unikać kontaktu z miękką tkanką. Jeśli produkty zetkną się z tkanką miękką, natychmiast dokładnie spłukać obszar wodą.
- Pacjent, lekarz i asystent muszą nosić okulary ochronne.
- Używać tylko zalecanych końcówek.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Jeśli nie jest używany koferdam, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nakładania OpalDam.
- W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej dokładnie wypłukać narażony obszar i skonsultować się z lekarzem.

Przygotowanie
1) Zalecane jest zrobienie zdjęć przed zabiegiem dla odniesienia.
2) Używając koferdamu i zacisków lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nakładania OpalDam/OpalDam Green, zaizolować leczony ząb lub ząby wraz z jednym zębem sąsiadującym z każdej strony.
3) Zdjąć nasadkę Luer lock ze strzykawki Opalustre i właściwie zamocować białą końcówkę Mac.
4) Sprawdzić wypływ materiału przed jego nałożeniem w obrębie jamy ustnej. W razie wystąpienia oporu wymienić końcówkę i sprawdzić ponownie.

Użytkowanie
1) Nałożyć warstwę Opalustre na obszar zabiegu.
2) Używając OpalCups Włosie przy wolnych obrotach (około 500 obr./min), wywierać przerywany średni lub duży nacisk przez około 60 sekund na nałożenie.
3) Usunąć pastę za pomocą odsysania, a następnie spłukać, sprawdzić, czy usunięto mniej niż 0,2 mm, i powtórzyć w razie potrzeby.

Sprzątanie
1) Po ostatnim płukaniu usunąć koferdam lub OpalDam/OpalDam Zielony. Dokładnie spłukać.
2) Użyć OpalCups Do wykańczania do polerowania powierzchni. Zalecany jest również zabieg fluorydowy.
3) Wykonać ostateczne zdjęcia dla odniesienia.

UWAGA: W przypadku nadwrażliwości pooperacyjnej zaleca się stosowanie azotanu potasu lub laki fluorkowych przez 30 minut do 8 godzin dziennie. Obszary głębokiej hipomineralizacji i niektóre przebarwienia mogą nie reagować na zabiegi i mogą wymagać estetycznych uzupełnień łączących. Zalecamy stosowanie produktów wybielających przed zabiegami Opalustre, ponieważ czasem można tego uniknąć. Jeśli stosowane są produkty wybielające, należy poczekać 7-10 dni przed nałożeniem uzupełnień estetycznych/łączących.

Odkażanie
Aby uniknąć przeniesienia zakażenia, pomiędzy kolejnymi zastosowaniami strzykawkę należy przecierać środkiem dezynfekującym poziomu pośredniego i używać jednorazowego rękawa barierowego. Jeśli nie używa się rękawa barierowego, strzykawkę należy traktować jako wyrób jednorazowy.

Przechowywanie i usuwanie
Odpady usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami, wytycznymi i rozporządzeniami.

Inne informacje
Wszelkie poważne incydenty należy zgłosić producentowi i organom odpowiedzialnemu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ 牙釉质研磨膏 ZH

产品描述
Opalustre 是一种化学和机械研磨软膏，含有 6.6% 的盐酸和碳化硅微粒，可以用水冲洗掉。
对于所描述的产品，使用前请仔细阅读并理解所有说明和 SDS 信息。

交货形式
- 1.2 毫升注射器
- 注射输送头
  - White Mac™ 输送头
- OpalCups™
  - Bristle
  - Finishing

组成
- 本产品主要由碳化硅、聚乙二醇、盐酸组成。具体成分详见产品技术要求。

适用症/预期目的
用于去除浅表 (<0.2 毫米深度) 的瑕疵，包括轻度氟中毒变色。

禁忌症
- 请勿用于严重氟中毒的患者。
- 请勿用于薄牙釉质的患者。
- 对于有过敏问题的患者或用户，请参阅 www.ultradent.com 上的产品过敏原文档。如果观察到过敏反应，请用水彻底冲洗暴露区域，并请患者咨询医生。

警告和注意事项
- 由于含有盐酸，使用本品时，细致的隔离非常重要。
- 避免接触软组织。如果产品与软组织接触，请立即用水彻底冲洗。
- 患者、临床医生和助手必须戴防护眼镜。
- 只准使用推荐输送头。
- 避免受热和/或阳光直射。
- 如果未使用橡皮障，请按照 OpalDam 的说明进行操作。
- 如果观察到过敏反应，请彻底冲洗暴露区域并让患者就医。

分步说明

准备
1) 建议拍摄初始照片以供参考。
2) 使用橡皮障和夹子，或按照 OpalDam / OpalDam Green的使用说明，隔离待治疗的一颗或多颗牙齿，包括每侧一颗相邻的牙齿。
3) 从 Opalustre 注射器上取下鲁尔锁帽并牢固地连接White Mac 输送头。
4) 在口腔内使用前检查出液是否顺畅。如遇到阻力，更输送头并重新检查。

使用
1) 在要治疗的区域涂抹一层 Opalustre。
2) 以慢 RPM (约 500 RPM) 使用 OpalCups Bristle，设置间歇式中等至重压力，每次运行持续约 60 秒。
3) 抽除糊状物，然后冲洗，评估是否已去除不到 0.2 毫米，必要时重复执行这一过程。

清理
1) 最后冲洗后，取下橡皮障或 OpalDam/OpalDam Green。彻底冲洗。
2) 使用 OpalCups Finishing进行表面抛光。还建议涂抹氟化物雾。
3) 拍摄最终照片以供参考。

注：对于术后敏感，建议每天使用硝酸钾或氟化物清漆产品 30 分钟至 8 小时。治疗可能对深处低矿化区域和一些污渍无效，可能需要美学粘合修复。我们建议在 Opalustre 治疗之前使用美白产品，因为这一过程有时可能会被避免。如果使用美白产品，请等待 7-10 天再放置任何美学/粘结修复体。

处理
为避免交叉污染，请在使用间隔用中级消毒剂擦拭注射器，并且使用一次性防护套。如果不使用防护套，则应将注射器视为一次性使用。

储存和处置
根据当地规则、准则和法规处置废弃物。

其他信息
向制造商和主管部门报告任何严重事故。
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Suspensie pentru microabrazivane smalțului RO

Descrierea produsului
Opalustre este o suspensie chimică și mecanică pentru abraziune ce conține acid clorhidric 6,6% și microparticule de carbură de siliciu ce pot fi clătite cu apă.
Pentru toate produsele descrise, citiți cu atenție și înțelegeți toate instrucțiunile și informațiile din fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

Formă de livrare
- Seringă de 1,2 ml
- Vârf de livrare
  - Vârf alb Mac™
- OpalCups™
  - Perie
  - Cupă de finisare

Compoziție
- Acid clorhidric
- Microparticule din carbură de siliciu

Instrucțiuni de utilizare/ Destinația produsului
Pentru îndepărtarea imperfecțiunilor superficiale (mai mici de 0,2 mm în adâncime), inclusiv decolorarea ușoară prin fluoroză.

Contraindicații
- Nu folosiți produsul pentru fluoroză severă.
- Nu folosiți produsul pe smalț subțire.
- Pentru pacienți sau utilizatori cu probleme de alergie, consultați documentul privind alergenul produs disponibil pe www.ultradent.com. Dacă se observă reacție alergică, clătiți bine zona expusă cu apă și cereți pacientului să consulte medicul.

Avertismente și precauții
- Datorită acidului clorhidric, izolarea meticuloasă este extrem de importantă în cazul utilizării acestui produs.
- Evitați contactul cu țesuturile moi. Dacă produsele intră în contact cu țesuturi moi, clătiți temeinic imediat zona cu apă.
- Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție.
- Folosiți numai vârfuri recomandate.
- Feriți produsul de căldură și lumina directă a soarelui.
- Dacă nu se folosește o digă dentară, urmați instrucțiunile pentru aplicarea OpalDam.
- Dacă remarcați o reacție alergică, clătiți temeinic zona expusă și îndrumați pacientul să consulte medicul.

Instrucțiuni etapizate

Pregătire
1) Se recomandă să faceți fotografii inițiale pentru referință ulterioară.
2) Folosind diga dentară și clemele sau urmând instrucțiunile pentru aplicarea OpalDam/ OpalDam verde, izolați dintele sau dinții care urmează să fie tratați împreună cu un dinte învecinat pe fiecare parte.
3) Scoateți capacul de blocare Luer de pe seringa Opalustre și fixați ferm vârful alb Mac.
4) Verificați fluxul înainte de a face aplicarea intraorală. În cazul în care remarcați rezistență, înlocuiți vârful și verificați din nou.

Utilizare
1) Aplicați stratul Opalustre pe zona de tratat.
2) Folosind o perie OpalCups la turație redusă (aproximativ 500 rpm), aplicați o presiune intermitentă medie până la mare timp de aproximativ 60 de secunde pe aplicație.
3) Scoateți pasta prin aspirare, apoi clătiți și verificați dacă s-a îndepărtat un strat mai redus de 0,2 mm și repetați procedura dacă este nevoie.

Curățarea
1) După clătirea finală, îndepărtați diga dentară sau OpalDam/OpalDam verde. Clătiți temeinic.
2) Utilizați cupa de finisare OpalCups pentru lustruirea suprafeței. De asemenea, se recomandă un tratament cu fluor.
3) Faceți fotografii finale pentru referință ulterioară.

NOTĂ: Pentru sensibilitatea post-operatorie, se recomandă nitrat de potasiu sau produse de lac fluorurat între 30 de minute până la 8 ore pe zi. Este posibil ca zonele cu hipomineralizare profundă și unele pete să nu răspundă la tratament și să necesite restaurări estetice cu material compozit. Recomandăm folosirea produselor de albire înainte de tratamentul cu Opalustre, deoarece această procedură poate fi uneori evitată. Dacă se folosesc produse de albire, așteptați 7-10 zile înainte de tratarea la restaurarea estetică.

Prelucrarea
Pentru a evita contaminarea încrucișată, stergeți seringa cu un dezinfectant intermediar între utilizări și folosiți un husa de protecție de unică folosință. Dacă nu este folosit o husă de protecție, seringa trebuie tratată ca pentru o unică utilizare.

Depozitarea și eliminarea
Eliminați deșeurile în conformitate cu normele, orientările și reglementările locale.

Informații diverse
Raportați orice incident grav producătorului și autorității competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Mikroabrazīvna pasta za sklenino SK

Opis produktu
Opalustre je chemická a mechanická abrazívna pasta obsahujúca 6,6 % kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka, ktoré je možné opláchnuť vodou.
Pred použitím ktoréhokoľvek produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny a bezpečnostné listy a porozumejte im.

Formy dodania
- 1,2 ml striekačka
- Aplikačné kanýly
  - Kanýla White Mac™
- OpalCups™
  - so štetčekom
  - dokončovacie

Zloženie
- Kyselina chlorovodíková
- Mikročastice karbidu kremíka

Indikácie na použitie/určený účel
Na odstránenie povrchových (<0,2 mm hĺbka) nedokonalostí, vrátane miernelho sfarbenia spôsobeného fluórózou.

Kontraindikácie
- Nepoužívať na ťažkú fluórózu.
- Nepoužívajte na tenkú sklovinu.
- Informácie o pacientoch s alergiou nájdete v dokumente o alergénoch na produkt, ktorý je k dispozícii na www.ultradent.com. Ak sa objaví alergická reakcia, opláchnite exponovanú oblasť dôkladne vodou a môžu vyžadovať estetické bondované výplne. Pred ošetrením Opalustrom odporúčame použiť bieliace prípravky, pretože niekedy sa tejto procedúre dá vyhnúť. Ak sa používajú bieliace výrobky, počkajte 7 až 10 dní, kým sa zhotovia akékoľvek estetické/bondované výplne.

Spracovanie Zaobchádzanie s produktom
Aby ste predišli krížovej kontaminácii, utrite injekčnú striekačku so stredne silným dezinfekčným prostriedkom medzi použitiami a použite jednorazový ochranný návlek. Ak nepoužívate ochranný návlek, injekčná striekačka má byť považovaná za jednorazovú.

Skladovanie a likvidácia
Odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, smernicami a nariadeniami.

Doplňujúce informácie
Každý vážny incident oznámte výrobcovi a príslušnému orgánu.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Opalustre™ Emalio mikroabrazinė mešanica za sklenino SL

Opis izdelka
Opalustre je kemična in mehanska abrazivna mešanica, ki vsebuje 6,6 % klorovodikove kisline in mikrodelce silicijevega karbida, ki jih je mogoče sprati z vodo.
Za vse opisane izdelke pred uporabo natančno preberite in se prepričajte, da razumete vsa navodila in informacije na varnostnem listu.

Obrazci dostavljanih izdelkov
- 1,2 ml brizga
- Konica za nanos
  - bela konica Mac
- OpalCups
  - Sčetina
  - Končna obdelava

Sestava
- Klorovodikova kislina
- Mikrodelci silicijevega karbida

Indikacije za uporabo / namen uporabe
Za odstranjevanje površinskih (<0,2 mm globine) nepopolnosti, vključno z blagim razbarvanjem zaradi fluoroze.

Kontraindikacije
- Ne uporabljajte pri hudi fluorozi.
- Ne uporabljajte na tanki sklenini.
- Za paciente ali uporabnike, ki imajo težave z alergijo, glejte dokument o alergenih izdelkih, ki je na voljo na spletni strani www.ultradent.com. Če opazite alergijsko reakcijo, izpostavljeno območje temeljito speritе z vodo in se bolnika posvetuje s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
- Zaradi klorovodikove kisline je izolacija ključnega pomembna pri uporabi tega izdelka.
- Izogibajte se stiku z mehkim tkivom. Če izdelki pridejo v stik z mehkimi tkivi, območje takoj temeljito speritе z vodo.
- Pacient, zdravnik in asistent morajo pri ravnanju z izdelkom nositi zaščitna očala.
- Uporabite samo priporočene konice.
- Hraniti stran od vročine in neposredne sončne svetlobe.
- Če ne boste uporabili prevleke iz lateksa, skledice ravodilom za uporabo za nanos OpalDam.
- Če opazite alergijsko reakcijo, temeljito izperite izpostavljeno območje in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Navodila po korakih

Priprava
1) Za sklicevanje na izhodiščno stanje je priporočljivo fotografirati začetno stanje.
2) Z gumijastimi prevlekami iz lateksa in sponkami ali z upoštevanjem navodil za nanos OpalDam / Zelenega OpalDam izolirajte zob oz. zobe, ki jih je treba obravnavati, in sicer z enim zobom na vsaki strani.
3) Odstranite pokrov zaklepa Luer iz brizge Opalustre in varno pritrdite belo konico Mac.
4) Pred peroralno uporabo preverite pretok. Če je upor čutiti, namenjajte konico in ponovno preverite.

Uporaba
1) Na površino, ki jo je treba obdelati, nanesite sloj Opalustre.
2) S sčetinami OpalCups pri počasnem tempu (približno 500 vrtljajev na minuto) uporabljajte prekinjeni medij do močnega pritiska približno 60 sekund na nanos.
3) S sesanjem odstranite pasto in nato sperite, ocenite, ali je bilo odstranjeno manj kot 0,2 mm in po potrebi ponovite postopek.

Čiščenje
1) Po končnem izpiranju odstranite prevleko iz lateksa oz. OpalDam / Zeleni OpalDam. Temeljito speritе.
2) Za poliranje površin uporabite OpalCups za zaključevanje. Priporočljivo je tudi zdravljenje s fluoridom.
3) Fotografirajte končno stanje po obdelavi in primerjajte z začetnim stanjem.

OPOMBA: V primeru občutljivosti pooperativnega izdelka s kalijevim nitratom ali fluoridnim lakom za 30 minut do 8 ur na dan. Območja globoke hipomineralizacije in nekateri made